

Cefovet[®] DC 250 mg

[Terug naar het overzicht](#)



Registratienummer:

BE-V182953

Op diergeneeskundig voorschrift.

 [Pagina doorsturen](#)

Voor welke dieren is dit product bedoeld



Samenstelling

Per spuit:
Cefazoline 250 mg

Wachttijden

Melkkoe: vlees en slachtafval: 21 dg
Melk: 0 dagen na het kalven indien deze plaatsvindt 6 weken of meer na toediening van het diergeneesmiddel.
In geval van vroegtijdig kalven (minder dan 6 weken na de behandeling): 14 dg
De wachttijd wordt bepaald vanaf de laatste toediening van het diergeneesmiddel. Ongeacht de wachttijd mag

gedurende de ganse behandelingsperiode geen enkel voedingsproduct toegelaten worden voor menselijke consumptie.

Indicaties

Melkkoe

- Voor de behandeling van subklinische mastitis gedurende de droogstand en de preventie van nieuwe bacteriële infecties van de uier tijdens de droogzetting veroorzaakt door de belangrijkste streptococci (*Streptococcus uberis*, *Streptococcus dysgalactiae*, *Streptococcus agalactiae*) en *Staphylococcus aureus*, gevoelig voor cefazoline.

Overige details

- Verpakking

Doos 60 x spuit 3 g / CNK: 3080-272

- Farmaceutische vorm

Suspensie voor intramammair

- Dosering

Melkkoe:

Intramammair, via het tepelkanaal.

250 mg cefazoline (overeenkomend met één spuit) per kwartier.

Elk kwartier volledig leegmelken na de laatste melkbeurt. Het tepeluiteinde ontsmetten en de inhoud van een spuit in elk kwartier instilleren via het tepelkanaal, met inachtnaam van de gebruikelijke regels van de asepsis. De koe niet meer melken.

- Contra-indicaties

Gebruik bij overgevoeligheid voor cefalosporines of andere β -lactamines.

- Bijwerkingen

Onmiddellijke allergische reacties zijn zeer zelden beschreven bij sommige dieren (rusteloosheid, bevingen, oedeem van de tepel, van de oogleden en de lippen) en kunnen tot de dood van de dieren leiden.

- Bewaarcondities en houdbaarheid

Bewaren beneden 25 °C.

Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 24 maanden.

- Registratiehouder

Dopharma Research B.V.

Waarschuwingen:

SPECIALE WAARSCHUWINGEN

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Resistentie wordt verwacht te evolueren bij sommige pathogene micro-organismen; het gebruik van het diergeneesmiddel moet dus gebaseerd zijn op de resultaten van gevoeligheidstesten.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

Cefalosporines en penicillines kunnen een overgevoeligheid veroorzaken (allergie) na injectie, inhalatie, ingestie of aanraking met de huid.

De overgevoeligheid aan penicillines kan tot een kruisreactie leiden met cefalosporines of omgekeerd.

De allergische reacties tegen deze substanties kunnen ernstig zijn.

Personen met een bekende overgevoeligheid voor cefalosporines of andere β -lactamines moeten contact met het diergeneesmiddel vermijden.

In geval van het verschijnen van huiderytheem, dient een arts te worden geraadpleegd.

In geval van het verschijnen van oedeem in het gelaat, de lippen, de ogen of het verschijnen van ademhalingsmoeilijkheden, dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd.

De handen wassen na het gebruik van het diergeneesmiddel.

Gebruik tijdens dracht of lactatie

Laboratoriumstudies konden geen enkel teratogeen of embryotoxisch effect aantonen bij de muis, de rat en het konijn.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)

De toedieningswijze van het diergeneesmiddel kan geen overdosering tot gevolg hebben.

Voor de afname van dit product verwijzen wij u graag door naar uw dierenarts. Bent u dierenarts? Neem contact op met Customer Service.

[Contact](#)