

Résumé d'AINS

Produit	La substance active	Espèces cibles	Voie d'admini-stration	Dosage (en mg/g/ml produit)	Pays
Aristal 100 mg/ml	kétoprofène	<u>NLD</u> : Bovins, Porcs <u>BEL</u> : Bovins, Porcs, Chevaux	<u>NLD</u> : IM <u>BEL</u> : Bo: IM/IV Su: IM Eq: IV	<u>Bo</u> : 3 ml/100 kg poids vif/1 fois par jour pendant jusqu'à 3 jours <u>Su</u> : <u>NLD</u> : 3 ml/100 kg poids vif , avec un max de 3 jours <u>BEL</u> : injection unique de 3 ml/100 kg poids vif <u>Eq</u> : 1 ml/45 kg poids vif, 3-5 jours	NLD BEL
Butagran Equi® 200 mg/g	phenylbutazone	Chevaux	Voie orale	Jour 1: 2 x 10 g par jour Jour 2-4: 2 x 5 g par jour > Jour 4: 1 x 5 g par jour	BEL
Melovem® 5 mg/ml	méloxicam	Bovins, Porcs	Bo: SC Su: IM	<u>Bo</u> : une fois 10 ml/100 kg poids vif <u>Su</u> : une fois 2 ml/25 kg poids vif	NLD, BEL
Melovem® 20 mg/ml	méloxicam	Bovins, Porcs, Chevaux	Bo: SC Su: IM Eq: IV	<u>Bo</u> : une fois 2.5 ml/100 kg poids vif <u>Su</u> : une fois 2 ml/100 kg poids vif <u>Eq</u> : une fois 3 ml /100 kg poids vif	NLD, BEL
Melovem® 30 mg/ml	méloxicam	Bovins, Porcs	Bo: SC Su: IM	<u>Bo</u> : une fois 2.5 ml/150 kg poids vif <u>Su</u> : une fois 2 ml/150 kg poids vif	NLD, BEL
Niglumine 50 mg/ml	flunixin	Bovins, Porcs, Chevaux	Bo: IV Su: IM Eq: IV	<u>Bo</u> : 2 ml/45 kg poids vif/jour, max 3 jours <u>Su</u> : 2 ml/45kg poids vif/jour, 2x/j, max 2 jours <u>Eq</u> : 1 ml/45 kg poids vif/jour, max 5 jours	NLD, BEL
Preventiron®	l'acide acétylsalicylique	Veaux	Par voie orale, par le lait	20 mg/kg poids vif, 2x	NLD
Sodium Salicyl® 80% WSP	salicylate de sodium	Veaux, Porcs	Par voie orale, dans l'eau potable ou par le lait	<u>Veaux</u> : 50 mg/kg poids vif/jour, 1-3 jours <u>Porcs</u> : 43.75 mg/kg poids vif/jour, 3-5 jours	NLD , BEL

Pour les informations complètes sur l'utilisation, consultez la notice ou l'SPC.